

Casus: In onderstaande woonvorm is COVID-19 uitgebroken. Alle cliënten zijn getest en bij de cliënten uit studio 10 en studio 20 is de uitslag positief. Er is die dag een team van 7 zorgprofessionals werkzaam, waarbij één collega positief blijkt. De rest van de collega's thuis test ook en is negatief.

- *Opdracht: werk samen uit hoe je omgaat met deze COVID-19 uitbraak. Wat zijn de problemen in deze situatie en hoe los je ze op?*

“Indien weigering van test: cliënt in quarantaine”

“Klachten van patiënten bijhouden en hierdoor zorgen voor vroege signalering”

“Rest van de afdeling in quarantaine”

“Bewoner 10 & 20 in isolatie, de rest testen op dag 5, positieve medewerker blijft thuis”

“Nagaan of bewoners op hun kamer kunnen blijven die besmet zijn. Alle bewoners op dag 5 nog een keer testen. Medewerkers PCR test.”

“Iedereen testen (zowel cliënten als personeel), studio 10 en 20 kamerisolatie. Werken met PBM's”

“Logeerkamer gebruiken als positieve huiskamer met 1 zorgmedewerker in isolatiekleding. Overige bewoners hertesten bij klachten met sneltest + pcr of op dag 5 met pcr”

“Lollypop testen, hoe betrouwbaar zijn die?”

“Cliënten die geen toestemming geven faecetesten”

“Goed idee om logeerkamer als positief cohort in te richten”

“Besmette bewoners op de kamers verplegen. Verpleging alleen PBM in deze 2 kamers aan. Of 'cohort' van 2 besmette bewoners maken: bewoner van studio 10 tijdelijk ruilen met bewoner studio 19, zodat deze bewoners nog wat contact samen hebben.”

“Cohort maken van de 2 besmette bewoners, samen met 1 begeleider”

“Bewezen positieve bewoners in isolatie”

“Probleem is afhankelijk of deze cliënten op hun kamer te isoleren zijn of niet. Indien niet dan zou een verhuizing of uitplaatsing overwogen kunnen worden”

